



FN MOTOL

Fakultní nemocnice v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Laboratoře ÚBLG**Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol**

Přednosta: Prof. MUDr. Milan Macek, DrSc., MHA

<http://www.fnmotol.cz/ublg/>

Ústav biologie a lékařské genetiky

Hereditární difuzní karcinom žaludku (HDGC, MIM 137215)

Hereditární difuzní karcinom žaludku (HDGC) je vzácný autosomálně dominantně dědičný syndrom hereditární predispozice k difuznímu karcinomu žaludku u osob obou pohlaví a ke zvýšenému riziku lobulárního karcinomu prsu u žen, způsobený patogenní zárodečnou mutací genu *CDHI*.

Molekulárně genetickým vyšetřením hereditárního difuzního karcinomu žaludku pomocí sekvenování genu *CDHI* je zjišťována přítomnost patogenní mutace genu *CDHI* v genomové DNA probanda. Průkaz patogenní mutace potvrdí diagnózu hereditárního difuzního karcinomu žaludku na molekulární úrovni.

užitečné odkazy:

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1139/><http://omim.org/entry/137215><http://omim.org/entry/192090>

Indikační kritéria

Připravuje se

Analytické metody

Metoda	Vyšetřované markery/oblasti:
Molekulárně genetické vyšetření hereditárního difuzního karcinomu žaludku metodou sekvenace jednotlivých exonů genu <i>CDHI</i> sekvenováním dle Sangerova	Vyšetření kódujících exonů genu <i>CDHI</i> Ref.Seq. GenBank NM_004360.3

Doby odezvy vzorků

Metoda	Doba odezvy (pracovní dny):	
	Běžně	Statim
Molekulárně genetické vyšetření hereditárního difuzního karcinomu žaludku metodou sekvenace jednotlivých exonů genu <i>CDHI</i> sekvenováním dle Sangerova	6 měsíců, kratší termín po domluvě s garantem metody Cílené vyšetření 1 měsíc	

Kontaktní informace

Oddělení lékařské molekulární genetiky

ÚBLG 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5,
150 06

Centrální příjem vzorků:

Po – Pá
7:30h – 14.30h

Požadavky na vzorek

Krev – 5-10 ml do K₃EDTA (děti 1-2ml)

Kultivované buňky plodové vody nebo choriové klky (10 mg)

Izolovaná DNA - 50 - 300 ng/μl a více v množství 50-100 μl

Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu značit jednoznačně jako DNA plodu

Odkazy

Transport vzorku musí respektovat maximální dobu stability vzorku - viz Laboratorní příručka ÚBLG. Transport vzorku poštou musí vyhovět požadavkům České pošty.