

Syndrom Dravetové (OMIM 182389)

V roce 1978 popsala Charlotte Dravetová SMEI - závažnou myoklonickou epilepsii v časném dětském věku. Pacienti trpí jak generalizovanými, tak parciálními záchvaty. Vážná myoklonická epilepsie začíná během prvního roku života a je následována psychomotorickou retardací a dalšími neurologickými problémy.

Přes 70 % pacientů se syndromem Dravetové má mutaci v genu *SCN1A*, nejčastěji nonsense a s posunem čtecího rámce, zatímco missense mutace jsou častější u GEFS+ (generalizovaná epilepsie s febrilními křečemi plus) – u 5-10 % pacientů. Missense mutace vedoucí ke SMEI leží převážně v pórové oblasti sodíkového kanálu.

Gen *SCN1A* na chromozomu 2q24 tvoří 26 exonů, je dlouhý 100 kb, mRNA má 6 030 bp.

Bylo popsáno přes 600 mutací, asi polovina jsou nonsense a delece vedoucí ke ztrátě funkce sodíkového kanálu. Pacienti s mutací vedoucí ke zkrácení proteinu mívají časnější nástup onemocnění. Korelace genotyp - fenotyp však neukazuje jasný vztah mezi typem mutace a jejím fenotypovým vyjádřením, funkční studie dosud nepotvrdily žádnou konzistentní souvislost mezi změnami ve vlastnostech kanálu a fenotypem.

De novo mutace bývají většinou paternálního původu, je však třeba brát v úvahu prokázanou existenci germinálního mozaicismu. Ten přispívá k fenotypové variabilitě, rodiče s mozaikou mohou být asymptomatictí nebo mají méně závažné postižení v závislosti na počtu buněk s mutací v mozku.

Záchvatová onemocnění spojená se *SCN1A* se dědí autozomálně dominantně.

Významné množství pacientů se SMEI má v rodinné anamnéze záchvatové onemocnění nebo febrilní křeče zapadající do spektra GEFS+. Nosiči mutace bez penetrance a různá míra exprese postižení nosičů implikují, že s kanálopatiemi souvisí různé modifikátory funkce v genetickém pozadí. Důsledkem je u velkého počtu mutací široká variabilita v závažnosti postižení. Jedná se patrně o polygenní syndrom – pacienti se stejnou mutací mají různý fenotyp.

Vyšetření může indikovat pouze lékařský genetik.

Indikační kritéria

(<http://www.dravetfoundation.org/dravet-syndrome/consider-dravet/diagnostic-criteria>)

- záchvaty v prvním roce života jinak zdravého dítěte
- záchvaty generalizované nebo unilaterální, protrahované
- po prvním roce života se objeví jiné typy záchvatů, myoklonické, absence, parciální komplexní
- prakticky u všech pacientů delší vystavení vysokým teplotám vyvolá záchvat
- záchvaty spojené s horečkami při nemoci nebo po vakcinaci, s horkými koupelemi, zvýšenou aktivitou a náhlými změnami teploty
- záchvaty může někdy přivodit prudké světlo či některé vizuální vjemy
- EEG je zpočátku často normální, později vykazuje zpomalení aktivity pozadí generalizované mnohočetné hroty
- většina pacientů se zpočátku vyvíjí normálně, během prvních let života se však vývoj zpomaluje nebo stagnuje
- prakticky u všech pacientů jistá míra hypotonie
- mnozí pacienti mají nestabilní chůzi a problémy s rovnováhou
- mladší pacienti mívají pronaci kotníku a ploché nohy, někteří postupem času chodí shrbeně

Analytické metody

Metoda	Vyšetřované markery/oblasti:
Cílené vyšetření metodou sekvenování dle Sangera	Mutace v kódující oblasti genu <i>SCN1A</i> Ref. Sek. NM_001165963.1
Cílené vyšetření pomocí SALSA MLPA kitu P137 (MRC - Holland)	Delece a duplikace u vybraných exonů genu <i>SCN1A</i>
Vyšetření metodou NGS - panel v rámci WES	Mutace a změny počtu kopií kódující oblasti genu <i>SCN1A</i> Ref. Sek. NM_001165963.1

Doby odezvy vzorků

Metoda	Doba odezvy (pracovní dny):	
	Běžně	Statim
Cílené vyšetření <i>SCN1A</i> metodou sekvenování dle Sangera a MLPA vyšetření <i>SCN1A</i> genu	25	10
Vyšetření metodou NGS – panel v rámci WES	120	25

Kontaktní informace

Oddělení lékařské molekulární genetiky,

4.patro, G

ÚBLG 2. LF UK a FN Motol,

V úvalu 84/1, Praha 5, 150 06

Centrální příjem vzorků:

Po–Pá

7:30 až 14:30 h

Požadavky na vzorek

Krev: min. 4 ml do K₃EDTA

Izolovaná DNA: koncentrace 50–300 ng/μl a více v množství minimálně 200 μl

Vzorek označit minimálně jménem, příjmením a rodným číslem pacienta a datem odběru vzorku. DNA plodu označit jednoznačně jako DNA plodu.

Odkazy

Wallace et al, Am J Hum Genet 2001 Apr;68(4):859-65
Claes et al, Am J Hum Genet 2001 Jun;68(6):1327-32

Transport vzorku musí respektovat maximální dobu stability vzorku - viz Laboratorní příručka ÚBLG. Transport vzorku poštou musí vyhovět požadavkům České pošty.