

Žlutá zimnice

Co to je?

Žlutá zimnice je závažné systémové virové horečnaté onemocnění přenášené komáry rodu *Aedes* či *Haemagogus*. Nemoc se řadí díky svým projevům mezi tzv. krvácivé horečky, pro které je typické vysoké riziko úmrtí nakažených osob.

Výskyt v ČR a v zahraničí

Případy žluté zimnice jsou hlášeny především ze zemí subsaharské Afriky a Latinské Ameriky. Infekce se nevyskytuje v Asii. Každoročně se vyskytne přibližně 200 tisíc případů, z toho 30 tisíc končí úmrtím nakaženého. V ČR se toho onemocnění nevyskytuje, za posledních 10 let byl zaznamenán pouze 1 importovaný případ v roce 2018.

Jak se můžu nakazit?

K přenosu nákazy dochází sáním infikovaných komárů. Rezervoárem je nemocný člověk nebo primát.

Kdo patří mezi ohrožené osoby infekce/komplikovaného průběhu

Infekcí jsou ohroženi cestovatelé, kteří vyjíždějí do oblastí epidemického či endemického výskytu. Riziko závažnějšího průběhu bylo popsáno u osob vyššího věku a pacientů s poruchou imunity.

Inkubační doba

Inkubační doba je krátká, přibližně 3 až 6 dnů.

Jak se infekce projevuje?

Mezi hlavní příznaky žluté zimnice patří náhle vzniklá horečka provázená schváceností, bolestí hlavy, svalů a kloubů. V tomto "červeném stadiu" dochází k zarudnutí obličeje a překrvení spojivek. Následně dochází buď ke spontánní úzdavě či po přechodném zlepšení stavu dochází k rozvoji tzv. "žlutého stádia", při kterém dochází k selhání jater, ledvin a krvácivým projevům. Onemocnění může progredovat až do multiorgánového selhání a úmrtí nemocného.

Jak se to léčí?

Specifická terapie žluté zimnice neexistuje. Léčba je podpůrná, v případě potřeby je poskytována intenzivní resuscitační péče.

Jaké jsou komplikace?

Smrtnost „žluté formy“ infekce je asi 20 až 50 %, hrozí selhání životně důležitých orgánů s krvácivými projevy.

OČKOVÁNÍ:

Vakcína: Stamaril

Základní typ vakcíny: živá oslabená (= atenuovaná) vakcína

Věková indikace: od 9 měsíců věku

Základní schéma: jednodávkové

Přeočkování: bez nutnosti přeočkování (u imunokompetentních osob)

Pro koho je očkování vhodné: cestovatelé podle rizika pobytu (v některých zemích povinné očkování)

Možné nežádoucí účinky: bolestivost, zarudnutí či otok v místě vpichu, bolest hlavy, kloubů, svalů, únava, malátnost, třesavka, závrať, zduření lymfatických uzlin, vyrážka, svědění kůže, bolest břicha, pocit na zvracení, průjem, zvýšená tělesná teplota či horečka, neurotropní nemoc související s očkováním proti žluté zimnici (zánět mozkových blan, mozku a míchy, ložiskové neurologické postižení, zmatenost, křeče, syndrom Guillain-Barré; riziko 0,8 případů na 100 000 očkovaných) a viscerotropní nemoc související s očkováním proti žluté zimnici (obdobné klinické projevy jako u žluté zimnice, riziko je zvýšené u osob nad 60 let, které dosud nikdy nebyly očkovány proti žluté zimnici; riziko 0,3 případů/100 000 očkovaných)

Úhrada: očkování není standardně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Některé zdravotní pojišťovny mohou poskytovat příspěvek v rámci preventivních programů.

Upozornění: Text má pouze informativní charakter. Podrobné informace o jednotlivých vakcínách, včetně jejich indikací či nežádoucích účinků, naleznete v příbalové informaci či SPC dané vakcíny. Očkování musí předcházet sestavení podrobné lékařské anamnézy a indikaci pro očkování vždy stanovuje lékař při konzultaci na základě platných doporučení. Informace o úhradách vakcíny se mohou lišit, aktuální informace o úhradě vakcíny či příspěvcích zdravotních pojišťoven naleznete na stránkách Vaší zdravotní pojišťovny či Vám je sdělíme při konzultaci v našem centru.